

gr mfer

ORGANOMİNERAL G BRE



**Tarlada izimiz
harmanda s z m z var**



Bilindiği üzere ülkemiz topraklarının büyük bir çoğunluğu organik madde bakımından fakir durumdadır. Bu durum uyguladığımız gübrelerin toprakta etkin olarak kullanılamamasına yol açmaktadır. Organik madde yönünden topraklarımızın zenginleştirilmesi, toprakta bağlı haldeki bitki besin elementlerinin de bitki tarafından alınabilir forma geçmesini sağlayacaktır.

GROMFER GÜBRE olarak 60.000 Ton/Yıl Organomineral Granül-15.000 Ton/Yıl Organik Pellet kapasiteli ve son teknoloji üretim tesislerimizde hizmet vermekteyiz. Organik madde açısından zenginleştirilmiş organomineral gübrelerin üretimi ve pazarlamaları noktasında kaliteli ürünlerle üreticilerimizin her daim yanındayız.

BALIKESİR, FOÇA ve KUYUCAK

Biyogaz Üretim Tesislerimizde enerji üretiminden sonra fermantasyon sonucu elde ettiğimiz yüksek kaliteli organik kompostu kullanarak organomineral gübre içeriğimizi zenginleştiriyoruz. Böylece bitkilerin kök bölgelerindeki mikroorganizmaların faaliyetlerinin artmasına yardımcı olurken, ayrıca gübrelerle beraber uyguladığımız bitki besin elementlerinden bitkilerin daha etkin biçimde yararlanmasını sağlamış oluyoruz.

Ülkemizde ve dünyada gıdaya erişim güvenliği giderek önemli hale gelmektedir. Bu kapsamda artan nüfus da göz önünde bulundurulduğunda, insanlığın ihtiyaçlarını gidermek üzere organik kökenli atıkların doğru şekilde değerlendirilmesi geleceğimiz adına yararlı olacaktır. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin elementlerini karşılarken sürdürülebilir tarım için topraklarımıza sahip çıkmak temel hedeflerimizdendir.

Neden Gromferi Tercih Etmelisiniz?

- ➔ Gübrelerimizin üretiminde insan, hayvan ve bitki sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasalları kullanmamaya özen gösteriyoruz.
- ➔ Üretimlerimizde kaliteli hammaddeleri ve organik madde içeriği en yüksek kompostlarımızı kullanıyoruz.
- ➔ Bütün formülasyonlarımızda suda çözünür kükürt trioksit bulunmaktadır. Kükürt, toprak pH'sını düşürdüğü için bitkinin besin elementleri alımını artırır.
- ➔ Gübrelerimizi toprakta su ile kolay çözünebilen uniform granül yapıda olmasını sağlayan yüksek teknoloji makinelerimizle yapıyoruz. Bu sayede uygulama esnasında gübrelerimiz alet ve ekipmanlarda tıkanmalara yol açmazken toprakta hızla çözülerek bitki tarafından kolaylıkla alınabiliyor.
- ➔ Gübre üretiminde bitkilere ve toprağa hayat katan, biyogaz tesislerimizde fermantasyon sonucu elde ettiğimiz organik madde içeriği zengin kompost ve humik- fulvik asit içeriği yüksek leonardit kullanıyoruz.
- ➔ Gübrelerimizi bitkilerin ihtiyaç duyduğu mikro besin elementleri (B,Zn,Mn) ile de ayrıca zenginleştiriyoruz.

Neden Organomineral Gübre

Organomineral gübre kullanımında dekar başına devlet tarafından verilen gübre desteğine ilave olarak ayrıca destek verilmektedir.

- ➔ Toprağı organik maddece zenginleştirir.
- ➔ Toprağa gübreler ile verilen besin maddelerinin yıkanmasının önüne geçer.
- ➔ Toprakta bağlı formdan bulunan besin maddelerinin bitkiler tarafından alınabilir hale geçmesini sağlar.
- ➔ Tuzluluğa bağlı sıkıntıların azaltılmasına yardımcı olur.
- ➔ Hastalık ve zararlara karşı direnç kazandırır. Sağlıklı kök gelişimini destekler.
- ➔ Bitkilerde erkencilik ve güçlü vejetatif gelişimi sağlar.

gr mfer

NPK'LI KATI ORGANOMİNERAL G BRELER





$$11.11.11 + (11\text{SO}_3) + \text{Zn}$$

İçerisindeki elementler sayesinde bitkinin temel besin element ihtiyacının giderilmesine yardımcı olur. Toprakta kaymak tabakası oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Toprağın organik madde miktarını artmasına katkı sağlar. Doğal şelatlama özelliği olduğundan daha önce kullanılan kimyevi gübreleri çözerek bitkiye kazandırılmasına katkı sağlar. Suda çözünen kireci parçalayarak kalsiyuma dönüştürdüğü için topraktaki tuzluluk oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Yüksek tonajlı ve kaliteli ürün elde edilmesine yardım eder. Özellikle pancar, ayçiçeği, hububat, patates ve domates gibi ürünlerde önerilir.



Garanti Edilen İçerik	%(W/W)
Toplam Organik Madde	15
Toplam Azot	11
Amonyum Azotu (NH ₄ + -N)	7
Üre Azotu (NH ₂ -N)	4
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	11
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	10,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	11
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	11
Toplam Çinko	0,5
Maksimum Nem	5
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	5
Maksimum Klorür Miktarı (Cl-)	8,5
EC	20 (dS/m)
pH	5-7

Kullanım Şekli: Ekim Öncesi Taban Gübresi Olarak Toprakdan Uygulanır.		
Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı		
Bitki Deseni	Kullanım Miktarı	Birimi
Patates	90 - 100	kg/da
Buğday - Arpa	25 - 40	kg/da
Pamuk	50 - 60	kg/da
Çeltik	50 - 60	kg/da
Mısır	50 - 60	kg/da
Şeker Pancarı	70 - 80	kg/da
Soğan	50 - 60	kg/da
Ayçiçeği	25 - 40	kg/da
Açık Tarla Sebzeleri	50 - 70	kg/da
Sera Sebzeleri	75 - 100	kg/da
Karpuz	50 - 60	kg/da
Havuç - Turp	50 - 60	kg/da
Zeytin (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	1 - 4	kg/ağaç
Elma (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Üzüm (Bağ)	30 - 70	kg/da
Enginar	50 - 60	kg/da
Çilek	50 - 60	kg/da
Yer Fıstığı	30 - 50	kg/da
Muz	70 - 80	kg/da

“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.”

$$12.12.12 + (12\text{SO}_3) + \text{Zn}$$

İçerisindeki elementler sayesinde bitkinin temel besin element ihtiyacının giderilmesine yardımcı olur. Toprakta kaymak tabakası oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Toprağın organik madde miktarını artmasına katkı sağlar. Doğal şelatlama özelliği olduğundan daha önce kullanılan kimyevi gübreleri çözerek bitkiye kazandırılmasına katkı sağlar. Suda çözünen kireci parçalayarak kalsiyuma dönüştürdüğü için topraktaki tuzluluk oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Yüksek tonajlı ve kaliteli ürün elde edilmesine yardım eder. Özellikle pancar, ayçiçeği, hububat, patates ve meyve bahçeleri gibi ürünlerde önerilir.



Garanti Edilen İçerik	%(W/W)
Toplam Organik Madde	15
Toplam Azot	12
Amonyum Azotu (NH ₄ + -N)	8
Üre Azotu (NH ₂ -N)	4
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	12
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	11
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	12
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	12
Toplam Çinko	0,5
Maksimum Nem	5
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	5
Maksimum Klorür Miktarı (Cl-)	9
EC	20 (dS/m)
pH	5-7

Kullanım Şekli: Ekim Öncesi Taban Gübresi Olarak Toprakdan Uygulanır.		
Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı		
Bitki Deseni	Kullanım Miktarı	Birimi
Patates	90 - 120	kg/da
Buğday - Arpa	25 - 40	kg/da
Pamuk	50 - 70	kg/da
Çeltik	50 - 60	kg/da
Mısır	75 - 100	kg/da
Şeker Pancarı	70 - 90	kg/da
Soğan	50 - 60	kg/da
Ayçiçeği	25 - 40	kg/da
Açık Tarla Sebzeleri	50 - 70	kg/da
Sera Sebzeleri	75 - 100	kg/da
Karpuz	50 - 60	kg/da
Havuç - Turp	50 - 60	kg/da
Zeytin (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	1 - 4	kg/ağaç
Elma (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Üzüm (Bağ)	30 - 70	kg/da
Enginar	50 - 60	kg/da
Çilek	50 - 60	kg/da
Yer Fıstığı	30 - 50	kg/da
Muz	70 - 90	kg/da

“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.”

$$6.16.6 + (15\text{SO}_3) + \text{Zn}$$

İçerisindeki elementler sayesinde bitkinin temel besin element ihtiyacını giderilmesine yardımcı olur. Toprakta kaymak tabakası oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Toprağın organik madde miktarını artmasına katkı sağlar. Suda çözünen kireci parçalayarak kalsiyuma dönüştürdüğü için topraktaki tuzluluk oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Yüksek tonajlı ve kaliteli ürün elde edilmesine yardım eder. Özellikle yumru bitkileri, ayçiçeği, hububat ve sebze gibi ürünlerde önerilir.



Garanti Edilen İerik	%(W/W)
Toplam Organik Madde	15
Toplam Azot	6
Amonyum Azotu (NH ₄ + -N)	6
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	16
Suda özünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	15
Suda özünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	6
Suda özünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	15
Toplam inko	0,5
Toplam Ca	9
Maksimum Nem	5
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	5
Maksimum Klorür Miktarı (Cl-)	5
EC	20 (dS/m)
pH	5-7

Kullanım Şekli: Ekim Öncesi Taban Gübresi Olarak Toprakdan Uygulanır.		
Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı		
Bitki Deseni	Kullanım Miktarı	Birimi
Patates	90 - 110	kg/da
Buğday - Arpa	25 - 40	kg/da
Pamuk	50 - 60	kg/da
eltik	50 - 60	kg/da
Mısır	50 - 60	kg/da
Şeker Pancarı	70 - 90	kg/da
Soğan	50 - 60	kg/da
Ayieği	25 - 40	kg/da
Aık Tarla Sebzeleri	50 - 70	kg/da
Sera Sebzeleri	75 - 100	kg/da
Karpuz	50 - 60	kg/da
Havuç - Turp	50 - 60	kg/da
Zeytin (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Sert ve Yumuşak ekirdekli Meyve Ağaçları	1 - 4	kg/ağaç
Elma (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Üzüm (Bağ)	30 - 70	kg/da
Enginar	50 - 60	kg/da
ilek	50 - 60	kg/da
Yer Fıstığı	30 - 50	kg/da
Muz	70 - 90	kg/da

“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.”

Gromfer

7.18.20+Zn

İçeriğindeki yüksek oranlı elementler sayesinde bitkinin temel besin element ihtiyacını giderilmesine yardımcı olur. Toprakta kaymak tabakası oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Toprağın organik madde miktarını artmasına katkı sağlar. Yüksek tonajlı ve kaliteli ürün elde edilmesine yardım eder. Şeker Pancarı polar değeri artmasına katkıda bulunur. Özellikle pancar ve meyve bahçelerinde kullanımı önerilir.



Garanti Edilen İçerik	%(W/W)
Toplam Organik Madde	15
Toplam Azot	7
Amonyum Azotu (NH ₄ + -N)	7
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	18
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	17
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	20
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	3
Toplam Çinko	0,5
Maksimum Nem	5
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	5
Maksimum Klorür Miktarı (Cl ⁻)	15
EC	30 (dS/m)
pH	5-7

Kullanım Şekli: Ekim Öncesi Taban Gübresi Olarak Topraktan Uygulanır.		
Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı		
Bitki Deseni	Kullanım Miktarı	Birimi
Patates	15 - 25	kg/da
Buğday - Arpa	5 - 10	kg/da
Pamuk	10 - 15	kg/da
Çeltik	10 - 20	kg/da
Mısır	15 - 25	kg/da
Şeker Pancarı	10 - 20	kg/da
Soğan	10 - 20	kg/da
Ayçiçeği	15 - 20	kg/da
Açık Tarla Sebzeleri	10 - 20	kg/da
Sera Sebzeleri	20 - 30	kg/da
Karpuz	10 - 20	kg/da
Havuç - Turp	10 - 20	kg/da
Zeytin (yaşına göre)	0,5 - 1,5	kg/ağaç
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	0,5 - 1,5	kg/ağaç
Elma (yaşına göre)	0,5 - 1,5	kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	0,5 - 1,5	kg/ağaç
Üzüm (Bağ)	10 - 20	kg/da
Enginar	10 - 20	kg/da
Çilek	15 - 20	kg/da
Yer Fıstığı	15 - 20	kg/da
Muz	50 - 100	kg/da

“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.”

Gromfer

10.10.10+(15SO₃)+Zn

İçerisindeki elementler sayesinde bitkinin temel besin element ihtiyacını giderilmesine yardımcı olur. Toprakta kaymak tabakası oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Toprağın organik madde miktarını artmasına katkı sağlar. Doğal şelatlama özelliği olduğundan daha önce kullanılan kimyevi gübreleri çözerek bitkiye kazandırılmasına katkı sağlar. Suda çözünen kireci parçalayarak kalsiyuma dönüştürdüğü için topraktaki tuzluluk oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Yüksek tonajlı ve kaliteli ürün elde edilmesine yardım eder. Özellikle pancar, ayçiçeği, hububat ve endüstri bitkilerinde kullanımı önerilir.



Garanti Edilen İerik	%(W/W)
Toplam Organik Madde	15
Toplam Azot	10
Amonyum Azotu (NH ₄ + -N)	7
Üre Azotu (NH ₂ -N)	3
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	10
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	9
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	10
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	15
Toplam Çinko	0,5
Maksimum Nem	5
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	5
Maksimum Klorür Miktarı (Cl-)	8
EC	20 (dS/m)
pH	5-7

Kullanım Şekli: Ekim Öncesi Taban Gübresi Olarak Toprakdan Uygulanır.		
Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı		
Bitki Deseni	Kullanım Miktarı	Birimi
Patates	90 - 110	kg/da
Buğday - Arpa	25 - 40	kg/da
Pamuk	50 - 60	kg/da
Çeltik	50 - 60	kg/da
Mısır	50 - 60	kg/da
Şeker Pancarı	70 - 90	kg/da
Soğan	50 - 60	kg/da
Ayçiçeği	25 - 40	kg/da
Açık Tarla Sebzeleri	50 - 70	kg/da
Sera Sebzeleri	75 - 100	kg/da
Karpuz	50 - 60	kg/da
Havuç - Turp	50 - 60	kg/da
Zeytin (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	1 - 4	kg/ağaç
Elma (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Üzüm (Bağ)	30 - 70	kg/da
Enginar	50 - 60	kg/da
Çilek	50 - 60	kg/da
Yer Fıstığı	30 - 50	kg/da
Muz	70 - 90	kg/da

“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.”

9.9.9 + (16SO₃) + Zn

İçerisindeki elementler sayesinde bitkinin temel besin element ihtiyacını giderilmesine yardımcı olur. Toprakta kaymak tabakası oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Toprağın organik madde miktarını artmasına katkı sağlar. Yüksek tonajlı ve kaliteli ürün elde edilmesine yardım eder. Özellikle pancar, ayçiçeği, hububat ve patates gibi ürünlerde önerilir.



Garanti Edilen İçerik	%(W/W)
Toplam Organik Madde	20
Toplam Azot	9
Amonyum Azotu (NH ₄ + -N)	7
Üre Azotu (NH ₂ -N)	2
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	9
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	8
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	9
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	16
Toplam Çinko	0,5
Maksimum Nem	5
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	7
Maksimum Klorür Miktarı (Cl-)	7
EC	20 (dS/m)
pH	5-7

Kullanım Şekli: Ekim Öncesi Taban Gübresi Olarak Topraktan Uygulanır.		
Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı		
Bitki Deseni	Kullanım Miktarı	Birimi
Patates	90 - 110	kg/da
Buğday - Arpa	25 - 40	kg/da
Pamuk	50 - 60	kg/da
Çeltik	50 - 60	kg/da
Mısır	50 - 60	kg/da
Şeker Pancarı	70 - 90	kg/da
Soğan	50 - 60	kg/da
Ayçiçeği	25 - 40	kg/da
Açık Tarla Sebzeleri	50 - 70	kg/da
Sera Sebzeleri	75 - 100	kg/da
Karpuz	50 - 60	kg/da
Havuç - Turp	50 - 60	kg/da
Zeytin (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	1 - 4	kg/ağaç
Elma (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Üzüm (Bağ)	30 - 70	kg/da
Enginar	50 - 60	kg/da
Çilek	50 - 60	kg/da
Yer Fıstığı	30 - 50	kg/da
Muz	70 - 90	kg/da

“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.”

$$15.5.5 + (20\text{SO}_3) + \text{Zn}$$

İçerisindeki elementler sayesinde bitkinin temel besin element ihtiyacını giderilmesine yardımcı olur. Toprakta kaymak tabakası oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Toprağın organik madde miktarını artmasına katkı sağlar. Doğal şelatlama özelliği olduğundan daha önce kullanılan kimyevi gübreleri çözerek bitkiye kazandırılmasına katkı sağlar. Suda çözünen kireci parçalayarak kalsiyuma dönüştürdüğü için topraktaki tuzluluk oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Yüksek tonajlı ve kaliteli ürün elde edilmesine yardım eder. Özellikle pancar, ayçiçeği, hububat ve patates gibi ürünlerde önerilir.



Garanti Edilen İçerik	%(W/W)
Toplam Organik Madde	15
Toplam Azot	15
Amonyum Azotu (NH ₄ + -N)	8
Üre Azotu (NH ₂ -N)	7
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	15
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	14
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	5
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	20
Toplam Çinko	0,5
Maksimum Nem	5
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	5
Maksimum Klorür Miktarı (Cl-)	4
EC	20 (dS/m)
pH	5-7

Kullanım Şekli: Ekim Öncesi Taban Gübresi Olarak Topraktan Uygulanır.		
Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı		
Bitki Deseni	Kullanım Miktarı	Birimi
Çay	100 - 150	kg/da
Fındık	1 kg/Ocak	kg
Patates	80 - 120	kg/da
Buğday - Arpa	30 - 40	kg/da
Pamuk	40 - 50	kg/da
Çeltik	30 - 40	kg/da
Mısır	40 - 60	kg/da
Şeker Pancarı	50 - 60	kg/da
Soğan	40 - 50	kg/da
Ayçiçeği	30 - 50	kg/da
Açık Tarla Sebzeleri	50 - 60	kg/da
Sera Sebzeleri	60 - 80	kg/da
Karpuz	50 - 60	kg/da
Havuç - Turp	40 - 50	kg/da
Zeytin (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	1 - 4	kg/ağaç
Elma (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Üzüm (Bağ)	1 - 4	kg/da
Enginar	30 - 50	kg/da
Çilek	50 - 60	kg/da
Yer Fıstığı	50 - 70	kg/da
Muz	40 - 50	kg/da

“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.”

$$12.15.5 + (15\text{SO}_3) + \text{Zn}$$

İçerisindeki elementler sayesinde bitkinin temel besin element ihtiyacını giderilmesine yardımcı olur. Toprakta kaymak tabakası oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Toprağın organik madde miktarını artmasına katkı sağlar. Tonaj, kalite ve polar -briks gibi değerlerin artmasına katkıda bulunur. Özellikle şekerpancarı, ayçiçeği, hububat ve patates üretiminde kullanımı önerilir.



Garanti Edilen İçerik	%(W/W)
Toplam Organik Madde	15
Toplam Azot	12
Amonyum Azotu (NH ₄ + -N)	9
Üre Azotu (NH ₂ -N)	3
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	15
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	14
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	5
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	15
Toplam Çinko	0,5
Maksimum Nem	5
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	5
Maksimum Klorür Miktarı (Cl-)	4
EC	20 (dS/m)
pH	5-7

Kullanım Şekli: Ekim Öncesi Taban Gübresi Olarak Topraktan Uygulanır.		
Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı		
Bitki Deseni	Kullanım Miktarı	Birimi
Patates	100 - 120	kg/da
Buğday - Arpa	25 - 40	kg/da
Pamuk	50 - 60	kg/da
Çeltik	40 - 50	kg/da
Mısır	50 - 60	kg/da
Şeker Pancarı	60 - 70	kg/da
Soğan	50 - 60	kg/da
Ayçiçeği	25 - 40	kg/da
Açık Tarla Sebzeleri	50 - 70	kg/da
Sera Sebzeleri	75 - 100	kg/da
Karpuz	50 - 60	kg/da
Havuç - Turp	50 - 60	kg/da
Zeytin (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	1 - 4	kg/ağaç
Elma (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Üzüm (Bağ)	30 - 70	kg/da
Enginar	50 - 60	kg/da
Çilek	50 - 60	kg/da
Yer Fıstığı	30 - 50	kg/da
Muz	90 - 110	kg/da

“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.”

$$7.18.7 + (7\text{SO}_3) + \text{Zn}$$


İçerisindeki elementler sayesinde bitkinin temel besin element ihtiyacını giderilmesine yardımcı olur. Toprakta kaymak tabakası oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Toprağın organik madde miktarını artmasına katkı sağlar. Doğal şelatlama özelliği olduğundan daha önce kullanılan kimyevi gübreleri çözerek bitkiye kazandırılmasına katkı sağlar. Suda çözünen kireci parçalayarak kalsiyuma dönüştürdüğü için topraktaki tuzluluk oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Yüksek tonajlı ve kaliteli ürün elde edilmesine yardım eder. Özellikle pancar, ayçiçeği, hububat ve patates gibi ürünlerde önerilir.



Garanti Edilen İçerik	%(W/W)
Toplam Organik Madde	20
Toplam Azot	7
Amonyum Azotu (NH ₄ + -N)	7
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	18
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	17
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	7
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	7
Toplam Çinko	0,5
Maksimum Nem	5
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	7
Maksimum Klorür Miktarı (Cl-)	6
EC	20 (dS/m)
pH	5-7

Kullanım Şekli: Ekim Öncesi Taban Gübresi Olarak Topraktan Uygulanır.		
Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı		
Bitki Deseni	Kullanım Miktarı	Birimi
Patates	80 - 120	kg/da
Buğday - Arpa	30 - 40	kg/da
Pamuk	40 - 50	kg/da
Çeltik	30 - 40	kg/da
Mısır	40 - 60	kg/da
Şeker Pancarı	50 - 60	kg/da
Soğan	40 - 50	kg/da
Ayçiçeği	30 - 50	kg/da
Açık Tarla Sebzeleri	50 - 60	kg/da
Sera Sebzeleri	60 - 80	kg/da
Karpuz	50 - 60	kg/da
Havuç - Turp	40 - 50	kg/da
Zeytin (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	1 - 4	kg/ağaç
Elma (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Üzüm (Bağ)	30 -50	kg/da
Enginar	50 - 60	kg/da
Çilek	50 - 70	kg/da
Yer Fıstığı	40 - 50	kg/da
Muz	50 - 60	kg/da

“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.”



grømfer

NP'Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRELER



$$8.21.0 + (15\text{SO}_3) + \text{Zn}$$

grāmfer 8.21.0+ (15SO₃)+Zn NP'Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

grāmfer

8.21.0+ (15SO₃)+Zn

FERMENTASYON SONUCU ELDE EDİLEN

NP'Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

Görüntü Edilen İçerik	% (O/W)
Çayınık Karbon	13
Top N	12
NH ₄ -N	8
Top P ₂ O ₅	21
Sülfür DİK. P ₂ O ₅	20
Sülfür DİK. SO ₃	15
Top Z	0.5
İhtak Nem	10
Hümitik/Fülvik Asit	5
İhtak C ₂	7
EC	20 (48%)
pH	5-7

Net: 50 Kg

grāmfer 8.21.0+ (15SO₃)+Zn NP'Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

grāmfer

Kullanım Talimatı Ekim Öncesi Nispet Bülteni Dönem Nispet Bülteni Örgütme

BİTKİ DÖNEMİNE GÖRE KULLANIM MİKTARI

Bitki Türleri	Kullanım Miktarı	Birim
Çiçek	100 - 150	kg/ha
Fındık	1 kg/ha	kg
Arpacık	80 - 120	kg/ha
Buğday - Arpa	30 - 60	kg/ha
Arpacık	50 - 100	kg/ha
Çavdar	30 - 60	kg/ha
Yeraz	40 - 60	kg/ha
Sakal Benekli	100 - 40	kg/ha
Yeraz	40 - 60	kg/ha
Arpacık	30 - 50	kg/ha
Ekim Tarihine Göre	20 - 40	kg/ha
Sarı Kuyruklu	40 - 60	kg/ha
Karabulut	40 - 60	kg/ha
Yeraz - Top	40 - 60	kg/ha
Yerazın İçerisinde	1 - 4	kg/ha
Sarı ve Karabulut, Önceki Nispet Mayasın İçerisinde	1 - 4	kg/ha
Ekim Tarihine Göre	1 - 4	kg/ha
Arpacık ve Yerazın İçerisinde	1 - 4	kg/ha
Yeraz - Top	1 - 4	kg/ha
Yerazın İçerisinde	30 - 50	kg/ha
Çiçek	40 - 60	kg/ha
Yerazın İçerisinde	10 - 20	kg/ha
Yeraz	40 - 60	kg/ha

*Yerazın İçerisinde yerazın miktarı yerazın miktarına göre belirlenir.

Toprak Nemli (100)

Lümen Nem (100)

Net Ağırlık: 50 kg

Özellik: Tuzlu, Kırılgan, Kırılgan

Sarı Kuyruklu (100)

Çiçek Nemli (100)

Yeraz Nemli (100)

Yeraz Nemli (100)

Yeraz Nemli (100)

Yeraz Nemli (100)

Yeraz Nemli (100)

Yeraz Nemli (100)

Yeraz Nemli (100)

Yeraz Nemli (100)

Yeraz Nemli (100)

Yeraz Nemli (100)

Yeraz Nemli (100)

Yeraz Nemli (100)

Yeraz Nemli (100)

Yeraz Nemli (100)

Yeraz Nemli (100)

Yeraz Nemli (100)

Yeraz Nemli (100)

FİRMAMIZ BİYOMERİT Ürünleri, Türkiye'de üretilen en kaliteli üründür.

Gübreler, toprakta yerli gübrelerle birlikte kullanılır.

Arpacık toprakta kullanılır ve toprakta yerli gübrelerle birlikte kullanılır.

Fermentasyon sonucu elde edilen

Organik gübreler, toprakta yerli gübrelerle birlikte kullanılır.

Organik gübreler, toprakta yerli gübrelerle birlikte kullanılır.

Organik gübreler, toprakta yerli gübrelerle birlikte kullanılır.

Organik gübreler, toprakta yerli gübrelerle birlikte kullanılır.

Organik gübreler, toprakta yerli gübrelerle birlikte kullanılır.

Organik gübreler, toprakta yerli gübrelerle birlikte kullanılır.

Organik gübreler, toprakta yerli gübrelerle birlikte kullanılır.

Organik gübreler, toprakta yerli gübrelerle birlikte kullanılır.

Organik gübreler, toprakta yerli gübrelerle birlikte kullanılır.

Organik gübreler, toprakta yerli gübrelerle birlikte kullanılır.

Organik gübreler, toprakta yerli gübrelerle birlikte kullanılır.

Organik gübreler, toprakta yerli gübrelerle birlikte kullanılır.

Organik gübreler, toprakta yerli gübrelerle birlikte kullanılır.

Organik gübreler, toprakta yerli gübrelerle birlikte kullanılır.

Organik gübreler, toprakta yerli gübrelerle birlikte kullanılır.

Organik gübreler, toprakta yerli gübrelerle birlikte kullanılır.

Organik gübreler, toprakta yerli gübrelerle birlikte kullanılır.

Garanti Edilen İçerik	%(W/W)
Toplam Organik Madde	15
Toplam Azot	12
Amonyum Azotu (NH ₄ + -N)	8
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	21
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	20
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	15
Toplam Çinko	0,5
Maksimum Nem	10
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	5
Maksimum Klorür Miktarı (Cl ⁻)	2
EC	20 (dS/m)
pH	5-7

Kullanım Şekli: Ekim Öncesi Taban Gübresi Olarak Topraktan Uygulanır.		
Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı		
Bitki Deseni	Kullanım Miktarı	Birimi
Çay	100 - 150	kg/da
Fındık	1 kg/Ocak	kg
Patates	80 - 120	kg/da
Buğday - Arpa	30 - 40	kg/da
Pamuk	40 - 50	kg/da
Çeltik	30 - 40	kg/da
Mısır	40 - 60	kg/da
Şeker Pancarı	50 - 60	kg/da
Soğan	40 - 50	kg/da
Ayçiçeği	30 - 50	kg/da
Açık Tarla Sebzeleri	50 - 60	kg/da
Sera Sebzeleri	60 - 80	kg/da
Karpuz	50 - 60	kg/da
Havuç - Turp	40 - 50	kg/da
Zeytin (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	1 - 4	kg/ağaç
Elma (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Üzüm (Bağ)	1 - 4	kg/da
Enginar	30 - 50	kg/da
Çilek	50 - 60	kg/da
Yer Fıstığı	50 - 70	kg/da
Muz	40 - 50	kg/da

“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.”

Gromfer

10.25.0+(10SO₃)+Zn

[illegible]

Garanti Edilen İçerik	%(W/W)
Toplam Organik Madde	15
Toplam Azot	10
Amonyum Azotu (NH ₄ ⁺ - N)	10
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	25
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	24
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	10
Toplam Çinko	0,5
Maksimum Nem	10
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	5
Maksimum Klorür Miktarı (Cl ⁻)	2
EC	30 (dS/m)
pH	5-7

Kullanım Şekli: Ekim Öncesi Taban Gübresi Olarak Topraktan Uygulanır.		
Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı		
Bitki Deseni	Kullanım Miktarı	Birimi
Patates	100 - 120	kg/da
Buğday - Arpa	25 - 35	kg/da
Pamuk	50 - 60	kg/da
Çeltik	30 - 40	kg/da
Mısır	50 - 60	kg/da
Şeker Pancarı	60 - 70	kg/da
Soğan	40 - 50	kg/da
Ayçiçeği	25 - 40	kg/da
Açık Tarla Sebzeleri	50 - 70	kg/da
Sera Sebzeleri	75 - 100	kg/da
Karpuz	50 - 60	kg/da
Havuç - Turp	50 - 60	kg/da
Zeytin (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	1 - 4	kg/ağaç
Elma (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Üzüm (Bağ)	30 - 70	kg/da
Enginar	50 - 60	kg/da
Çilek	50 - 60	kg/da
Yer Fıstığı	30 - 50	kg/da
Muz	80 - 100	kg/da

“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.”

$$9.21.0 + (10\text{SO}_3) + \text{Zn}$$
[illegible]

Garanti Edilen İçerik	%(W/W)
Toplam Organik Madde	20
Toplam Azot	9
Amonyum Azotu (NH ₄ ⁺ - N)	9
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	21
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	20
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	10
Toplam Çinko	0,5
Maksimum Nem	10
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	5
Maksimum Klorür Miktarı (Cl ⁻)	2
EC	30 (dS/m)
pH	5-7

Kullanım Şekli: Ekim Öncesi Taban Gübresi Olarak Toprakdan Uygulanır.		
Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı		
Bitki Deseni	Kullanım Miktarı	Birimi
Patates	80 - 100	kg/da
Buğday - Arpa	20 - 35	kg/da
Pamuk	30 - 40	kg/da
Çeltik	25 - 35	kg/da
Mısır	40 - 50	kg/da
Şeker Pancarı	40 - 50	kg/da
Soğan	40 - 50	kg/da
Ayçiçeği	30 - 40	kg/da
Açık Tarla Sebzeleri	40 - 50	kg/da
Sera Sebzeleri	60 - 80	kg/da
Karpuz	40 - 50	kg/da
Havuç - Turp	30 - 40	kg/da
Zeytin (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	1 - 4	kg/ağaç
Elma (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Üzüm (Bağ)	40 - 60	kg/da
Enginar	40 - 50	kg/da
Çilek	40 - 50	kg/da
Yer Fıstığı	25 - 30	kg/da
Muz	90 - 110	kg/da

“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.”

Gromfer

15.20.0+(10SO₃)+Zn

[illegible]

Garanti Edilen İçerik	%(W/W)
Toplam Organik Madde	20
Toplam Azot	15
Amonyum Azotu (NH ₄ ⁺ -N)	8
Üre Azotu (NH ₂ -N)	7
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	20
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	19
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	10
Toplam Çinko	0,5
Maksimum Nem	10
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	5
Maksimum Klorür Miktarı (Cl ⁻)	2
EC	30 (dS/m)
pH	5-7

Kullanım Şekli: Ekim Öncesi Taban Gübresi Olarak Toprakdan Uygulanır.		
Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı		
Bitki Deseni	Kullanım Miktarı	Birimi
Patates	80 - 100	kg/da
Buğday - Arpa	25 - 40	kg/da
Pamuk	30 - 40	kg/da
Çeltik	25 - 35	kg/da
Mısır	40 - 50	kg/da
Şeker Pancarı	40 - 50	kg/da
Soğan	40 - 50	kg/da
Ayçiçeği	30 - 40	kg/da
Açık Tarla Sebzeleri	40 - 50	kg/da
Sera Sebzeleri	60 - 80	kg/da
Karpuz	40 - 50	kg/da
Havuç - Turp	30 - 40	kg/da
Zeytin (yaşına göre)	2 - 5	kg/ağaç
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	2 - 5	kg/ağaç
Elma (yaşına göre)	2 - 5	kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	2 - 5	kg/ağaç
Üzüm (Bağ)	40 - 60	kg/da
Enginar	40 - 50	kg/da
Çilek	40 - 50	kg/da
Yer Fıstığı	25 - 30	kg/da
Muz	90 - 110	kg/da

“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.”

Gromfer

18.15.0+(10SO₃)+Zn

Toprağın Azot, Fosfor ihtiyacını karşılayarak toprağın temel elementler bakımından zenginleşmesine yardımcı olur. İçeriğindeki fosfor ve çinko sayesinde bitkinin daha iyi köklenmesine katkı sağlar. Ekinlerdeki kardeşlenmeyi çoğaltmaya yardımcı olur. Ürünün hızlı gelişmesine yardım eder. Başak danelerini daha iri ve dolgun olmasını sağlayarak bol ürün elde edilmesine yardımcı olur. İçerisindeki Kükürt toprak pH'sını aşağı düşürerek makro ve mikro element alımının hızlandırılmasına yardımcı olur. Buğday, Mısır, Pamuk ve Hububat için tavsiye edilir.



Garanti Edilen İçerik	%(W/W)
Toplam Organik Madde	20
Toplam Azot	18
Amonyum Azotu (NH ₄ ⁺ -N)	8
Üre Azotu (NH ₂ -N)	10
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	15
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	14
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	10
Toplam Çinko	0,5
Maksimum Nem	10
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	5
Maksimum Klorür Miktarı (Cl ⁻)	2
EC	30 (dS/m)
pH	5-7

Kullanım Şekli: Ekim Öncesi Taban Gübresi Olarak Toprakdan Uygulanır.		
Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı		
Bitki Deseni	Kullanım Miktarı	Birimi
Patates	80 - 100	kg/da
Buğday - Arpa	25 - 40	kg/da
Pamuk	30 - 40	kg/da
Çeltik	25 - 35	kg/da
Mısır	40 - 50	kg/da
Şeker Pancarı	40 - 50	kg/da
Soğan	40 - 50	kg/da
Ayçiçeği	30 - 40	kg/da
Açık Tarla Sebzeleri	40 - 50	kg/da
Sera Sebzeleri	60 - 80	kg/da
Karpuz	40 - 50	kg/da
Havuç - Turp	30 - 40	kg/da
Zeytin (yaşına göre)	2 - 5	kg/ağaç
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	2 - 5	kg/ağaç
Elma (yaşına göre)	2 - 5	kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	2 - 5	kg/ağaç
Üzüm (Bağ)	40 - 60	kg/da
Enginar	40 - 50	kg/da
Çilek	40 - 50	kg/da
Yer Fıstığı	25 - 30	kg/da
Muz	90 - 110	kg/da

“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.”

$$12.18.0 + (16\text{SO}_3) + \text{Zn}$$
[illegible]

Garanti Edilen İçerik	%(W/W)
Toplam Organik Madde	20
Toplam Azot	12
Amonyum Azotu (NH ₄ + -N)	11
Üre Azotu (NH ₂ -N)	1
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	18
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	17
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	16
Toplam Çinko	0,5
Maksimum Nem	10
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	5
Maksimum Klorür Miktarı (Cl-)	2
EC	30 (dS/m)
pH	5-7

Kullanım Şekli: Ekim Öncesi Taban Gübresi Olarak Toprakdan Uygulanır.		
Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı		
Bitki Deseni	Kullanım Miktarı	Birimi
Patates	100 - 120	kg/da
Buğday - Arpa	25 - 40	kg/da
Pamuk	50 - 60	kg/da
Çeltik	40 - 50	kg/da
Mısır	50 - 60	kg/da
Şeker Pancarı	60 - 70	kg/da
Soğan	50 - 60	kg/da
Ayçiçeği	25 - 40	kg/da
Açık Tarla Sebzeleri	50 - 70	kg/da
Sera Sebzeleri	75 - 100	kg/da
Karpuz	50 - 60	kg/da
Havuç - Turp	50 - 60	kg/da
Zeytin (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	1 - 4	kg/ağaç
Elma (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Üzüm (Bağ)	30 - 70	kg/da
Enginar	50 - 60	kg/da
Çilek	50 - 60	kg/da
Yer Fıstığı	50 - 60	kg/da

“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.”

$$12.15.0 + (20\text{SO}_3) + \text{Zn}$$

Toprağın Azot, Fosfor ihtiyacını karşılayarak toprağın temel elementler bakımından zenginleşmesine yardımcı olur. İçeriğindeki fosfor ve çinko sayesinde bitkinin daha iyi köklenmesine katkı sağlar. Ekinlerdeki kardeşlenmeyi çoğaltmaya yardımcı olur. Ürünün hızlı gelişmesine yardım eder. Başak danelerini daha iri ve dolgun olmasını sağlayarak bol ürün elde edilmesine yardımcı olur. İçerisindeki Kükürt toprak pH'sını aşağı düşürerek makro ve mikro element alımının hızlandırılmasına yardımcı olur. Buğday, Mısır, Pamuk ve Hububat için tavsiye edilir.



Garanti Edilen İçerik	%(W/W)
Toplam Organik Madde	20
Toplam Azot	12
Amonyum Azotu (NH ₄ ⁺ -N)	10
Üre Azotu (NH ₂ -N)	2
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	15
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	14
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	20
Toplam Çinko	0,5
Maksimum Nem	10
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	5
Maksimum Klorür Miktarı (Cl ⁻)	2
EC	30 (dS/m)
pH	5-7

Kullanım Şekli: Ekim Öncesi Taban Gübresi Olarak Topraktan Uygulanır.		
Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı		
Bitki Deseni	Kullanım Miktarı	Birimi
Patates	100 - 120	kg/da
Buğday - Arpa	25 - 40	kg/da
Pamuk	50 - 60	kg/da
Çeltik	40 - 50	kg/da
Mısır	50 - 60	kg/da
Şeker Pancarı	60 - 70	kg/da
Soğan	50 - 60	kg/da
Ayçiçeği	25 - 40	kg/da
Açık Tarla Sebzeleri	50 - 70	kg/da
Sera Sebzeleri	75 - 100	kg/da
Karpuz	50 - 60	kg/da
Havuç - Turp	50 - 60	kg/da
Zeytin (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	1 - 4	kg/ağaç
Elma (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Üzüm (Bağ)	30 - 70	kg/da
Enginar	50 - 60	kg/da
Çilek	50 - 60	kg/da
Yer Fıstığı	50 - 60	kg/da

“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.”

NP'Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

Gromfer

10.15.0+(12SO₃)+Zn

Toprağın Azot, Fosfor ihtiyacını karşılayarak toprağın temel elementler bakımından zenginleşmesine yardımcı olur. İçeriğindeki fosfor ve çinko sayesinde bitkinin daha iyi köklenmesine katkı sağlar. Ekinlerdeki kardeşlenmeyi çoğaltmaya yardımcı olur. Ürünün hızlı gelişmesine yardım eder. Başak danelerini daha iri ve dolgun olmasını sağlayarak bol ürün elde edilmesine yardımcı olur. İçerisindeki Kükürt toprak pH'sını aşağı düşürerek makro ve mikro element alımının hızlandırılmasına yardımcı olur. Buğday, Mısır, Pamuk ve Hububat için tavsiye edilir.



Garanti Edilen İçerik	%(W/W)
Toplam Organik Madde	30
Toplam Azot	10
Amonyum Azotu (NH ₄ ⁺ -N)	8
Üre Azotu (NH ₂ -N)	2
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	15
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	14
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	12
Toplam Çinko	0,5
Maksimum Nem	10
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	5
Maksimum Klorür Miktarı (Cl ⁻)	2
EC	30 (dS/m)
pH	5-7

Kullanım Şekli: Ekim Öncesi Taban Gübresi Olarak Toprakdan Uygulanır.		
Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı		
Bitki Deseni	Kullanım Miktarı	Birimi
Patates	100 - 120	kg/da
Buğday - Arpa	25 - 40	kg/da
Pamuk	50 - 60	kg/da
Çeltik	40 - 50	kg/da
Mısır	50 - 60	kg/da
Şeker Pancarı	60 - 70	kg/da
Soğan	50 - 60	kg/da
Ayçiçeği	25 - 40	kg/da
Açık Tarla Sebzeleri	50 - 70	kg/da
Sera Sebzeleri	75 - 100	kg/da
Karpuz	50 - 60	kg/da
Havuç - Turp	50 - 60	kg/da
Zeytin (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	1 - 4	kg/ağaç
Elma (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Üzüm (Bağ)	30 -70	kg/da
Enginar	50 - 60	kg/da
Çilek	50 - 60	kg/da
Yer Fıstığı	50 - 60	kg/da

“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.”

Gromfer

10.10.0+(10SO₃)+Zn

grāmfer

10.10.0+(10SO₃)+Zn

FERMENTASYON SONUCU ELDE EDİLEN

NP'Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

Gübreli Edilen İyileştirici	% (GW)
Çamgözü Kireçli	10
Top. N	10
Top. P ₂ O ₅	10
Top. K ₂ O	10
Top. Ca	10
Top. Mg	10
Top. Zn	10
Top. B	10
Top. Cu	10
Top. Mn	10
Top. Fe	10
Top. Na	10
Top. S	10
Top. Cl	10
Top. Br	10
Top. I	10
Top. Si	10
Top. Al	10
Top. Ti	10
Top. V	10
Top. Cr	10
Top. Ni	10
Top. Co	10
Top. Se	10
Top. Mo	10
Top. Sb	10
Top. Sn	10
Top. Ba	10
Top. Sr	10
Top. Zr	10
Top. Hf	10
Top. Ta	10
Top. Nb	10
Top. Bi	10
Top. At	10
Top. Rn	10
Top. Fr	10
Top. Ac	10
Top. Th	10
Top. Pa	10
Top. U	10
Top. Np	10
Top. Pu	10
Top. Am	10
Top. Cm	10
Top. Bk	10
Top. Cf	10
Top. Es	10
Top. Fm	10
Top. Md	10
Top. No	10
Top. Lr	10
Top. Yt	10
Top. Sc	10
Top. Ti	10
Top. V	10
Top. Cr	10
Top. Mn	10
Top. Fe	10
Top. Co	10
Top. Ni	10
Top. Cu	10
Top. Zn	10
Top. Ga	10
Top. Ge	10
Top. As	10
Top. Se	10
Top. Br	10
Top. Kr	10
Top. Rb	10
Top. Sr	10
Top. Y	10
Top. Zr	10
Top. Nb	10
Top. Mo	10
Top. Tc	10
Top. Ru	10
Top. Rh	10
Top. Pd	10
Top. Ag	10
Top. Cd	10
Top. In	10
Top. Sn	10
Top. Sb	10
Top. Te	10
Top. I	10
Top. Xe	10
Top. Ba	10
Top. La	10
Top. Ce	10
Top. Pr	10
Top. Nd	10
Top. Pm	10
Top. Sm	10
Top. Eu	10
Top. Gd	10
Top. Tb	10
Top. Dy	10
Top. Ho	10
Top. Er	10
Top. Tm	10
Top. Yb	10
Top. Lu	10
Top. Hf	10
Top. Ta	10
Top. W	10
Top. Re	10
Top. Os	10
Top. Ir	10
Top. Pt	10
Top. Au	10
Top. Hg	10
Top. Tl	10
Top. Pb	10
Top. Bi	10
Top. Po	10
Top. At	10
Top. Rn	10
Top. Fr	10
Top. Ac	10
Top. Th	10
Top. Pa	10
Top. U	10
Top. Np	10
Top. Pu	10
Top. Am	10
Top. Cm	10
Top. Bk	10
Top. Cf	10
Top. Es	10
Top. Fm	10
Top. Md	10
Top. No	10
Top. Lr	10
Top. Yt	10
Top. Sc	10
Top. Ti	10
Top. V	10
Top. Cr	10
Top. Mn	10
Top. Fe	10
Top. Co	10
Top. Ni	10
Top. Cu	10
Top. Zn	10
Top. Ga	10
Top. Ge	10
Top. As	10
Top. Se	10
Top. Br	10
Top. Kr	10
Top. Rb	10
Top. Sr	10
Top. Y	10
Top. Zr	10
Top. Nb	10
Top. Mo	10
Top. Tc	10
Top. Ru	10
Top. Rh	10
Top. Pd	10
Top. Ag	10
Top. Cd	10
Top. In	10
Top. Sn	10
Top. Sb	10
Top. Te	10
Top. I	10
Top. Xe	10
Top. Ba	10
Top. La	10
Top. Ce	10
Top. Pr	10
Top. Nd	10
Top. Pm	10
Top. Sm	10
Top. Eu	10
Top. Gd	10
Top. Tb	10
Top. Dy	10</

Garanti Edilen İçerik	%(W/W)
Toplam Organik Madde	40
Toplam Azot	10
Amonyum Azotu (NH ₄ ⁺ -N)	8
Üre Azotu (NH ₂ -N)	2
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	15
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	14
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	12
Toplam Çinko	0,5
Maksimum Nem	10
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	5
Maksimum Klorür Miktarı (Cl ⁻)	2
EC	30 (dS/m)
pH	5-7

Kullanım Şekli: Ekim Öncesi Taban Gübresi Olarak Toprakdan Uygulanır.		
Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı		
Bitki Deseni	Kullanım Miktarı	Birimi
Patates	100 - 120	kg/da
Buğday - Arpa	25 - 40	kg/da
Pamuk	50 - 60	kg/da
Çeltik	40 - 50	kg/da
Mısır	50 - 60	kg/da
Şeker Pancarı	60 - 70	kg/da
Soğan	50 - 60	kg/da
Ayçiçeği	25 - 40	kg/da
Açık Tarla Sebzeleri	50 - 70	kg/da
Sera Sebzeleri	75 - 100	kg/da
Karpuz	50 - 60	kg/da
Havuç - Turp	50 - 60	kg/da
Zeytin (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	1 - 4	kg/ağaç
Elma (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Üzüm (Bağ)	30 - 70	kg/da
Enginar	50 - 60	kg/da
Çilek	50 - 60	kg/da
Yer Fıstığı	30 - 50	kg/da

“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.”

NP'Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

Gromfer

12.12.0+(12SO₃)+Zn

Toprağın Azot, Fosfor ihtiyacını karşılayarak toprağın temel elementler bakımından zenginleşmesine yardımcı olur. İçeriğindeki fosfor ve çinko sayesinde bitkinin daha iyi köklenmesine katkı sağlar. Ekinlerdeki kardeşlenmeyi çoğaltmaya yardımcı olur. Ürünün hızlı gelişmesine yardım eder. Başak danelerini daha iri ve dolgun olmasını sağlayarak bol ürün elde edilmesine yardımcı olur. İçerisindeki Kükürt toprak pH'sını aşağı düşürerek makro ve mikro element alımının hızlandırılmasına yardımcı olur. Yüksek miktarda organik madde içeriği toprağı zenginleştirerek bağlı bulunan elementlerinde alımını kolaylaştırır. Buğday, Mısır, Pamuk ve Hububat için tavsiye edilir.



Garanti Edilen İçerik	%(W/W)
Toplam Organik Madde	30
Toplam Azot	12
Amonyum Azotu (NH ₄ ⁺ -N)	7
Üre Azotu (NH ₂ -N)	5
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	12
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	12
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	12
Toplam Çinko	0,5
Maksimum Nem	10
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	5
Maksimum Klorür Miktarı (Cl ⁻)	2
EC	30 (dS/m)
pH	5-7

Kullanım Şekli: Ekim Öncesi Taban Gübresi Olarak Toprakdan Uygulanır.		
Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı		
Bitki Deseni	Kullanım Miktarı	Birimi
Patates	100 - 120	kg/da
Buğday - Arpa	25 - 40	kg/da
Pamuk	50 - 60	kg/da
Çeltik	40 - 50	kg/da
Mısır	50 - 60	kg/da
Şeker Pancarı	60 - 70	kg/da
Soğan	50 - 60	kg/da
Ayçiçeği	25 - 40	kg/da
Açık Tarla Sebzeleri	50 - 70	kg/da
Sera Sebzeleri	75 - 100	kg/da
Karpuz	50 - 60	kg/da
Havuç - Turp	50 - 60	kg/da
Zeytin (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	1 - 4	kg/ağaç
Elma (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1 - 4	kg/ağaç
Üzüm (Bağ)	30 -70	kg/da
Enginar	50 - 60	kg/da
Çilek	50 - 60	kg/da
Yer Fıstığı	50 - 60	kg/da

“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.”



grömfer

AZOTLU KATI ORGANOMİNERAL GÜBRELER



Gromfer

28.0.0+(4SO₃)

Organik Madde ile kaplanmış yüksek üre azotu içerikli özel bir Organomineral üst gübresidir. Yapısında organik madde %30'dur ve kompost Menşeilidir. Üre azotu yapısı itibariyle nem olmayan ortamda Amonyak olarak uçup kaybolma eğilimindedir. Kompost ve leonardit temelli Organik Madde sayesinde bu kayıp neredeyse sıfıra inmektedir. Toprağın organik madde miktarını artmasına katkı sağlar. Pamuk, Mısır, Domates ve Şeker Pancarı gibi ürünlerde üst gübre olarak kullanılması önerilir.



Garanti Edilen İçerik	%(W/W)
Toplam Organik Madde	30
Toplam Azot	28
Amonyum Azotu (NH ₄ + -N)	1
Üre Azotu (NH ₂ -N)	27
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	4
Maksimum Nem	5
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	5
Maksimum Klorür Miktarı (Cl-)	2
EC	20 (dS/m)
pH	5-7

Kullanım Şekli: Ekim Öncesi Taban Gübresi Olarak Toprakdan Uygulanır.		
Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı		
Bitki Deseni	Kullanım Miktarı	Birimi
Patates	50 - 70	kg/da
Buğday - Arpa	30 - 40	kg/da
Pamuk	25 - 35	kg/da
Çeltik	30 - 50	kg/da
Mısır	30 - 50	kg/da
Şeker Pancarı	30 - 40	kg/da
Soğan	30 - 40	kg/da
Ayçiçeği	20 - 30	kg/da
Açık Tarla Sebzeleri	40 - 60	kg/da
Sera Sebzeleri	40 - 60	kg/da
Karpuz	30 - 50	kg/da
Havuç - Turp	30 - 40	kg/da
Zeytin (yaşına göre)	1 - 3 kg	kg/ağaç
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	1 - 3 kg	kg/ağaç
Elma (yaşına göre)	1 - 3 kg	kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1 - 3 kg	kg/ağaç
Üzüm (Bağ)	30 - 40	kg/da
Enginar	30 - 40	kg/da
Çilek	30 - 40	kg/da
Yer Fıstığı	30 - 40	kg/da
Muz	50 - 70	kg/da

“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.”

Gromfer

24.0.0+(24SO₃)

Organik Madde ile harmanlanmış amonyum azotu içerikli bir Organomineral taban ve üst gübresidir. Yapısında organik madde %20'dir. İçerisindeki yüksek kükürt sayesinde pH'yı dengeler ve diğer gübrelerinde alımını kolaylaştırır. Toprağın organik madde miktarını artmasına katkı sağlar. Tüm kültür bitkilerinde kullanılabilecek bir taban ve üst Organomineral gübresidir.



Garanti Edilen İçerik	%(W/W)
Toplam Organik Madde	20
Toplam Azot	24
Amonyum Azotu (NH ₄ ⁺ -N)	7
Üre Azotu (NH ₂ -N)	17
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	24
Maksimum Nem	5
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	5
Maksimum Klorür Miktarı (Cl ⁻)	0,5
EC	20 (dS/m)
pH	5-7

Kullanım Şekli: Ekim Öncesi Taban Gübresi Olarak Topraktan Uygulanır.		
Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı		
Bitki Deseni	Kullanım Miktarı	Birimi
Patates	50 - 70	kg/da
Buğday - Arpa	30 - 40	kg/da
Pamuk	25 - 35	kg/da
Çeltik	30 - 50	kg/da
Mısır	30 - 50	kg/da
Şeker Pancarı	30 - 40	kg/da
Soğan	30 - 40	kg/da
Ayçiçeği	20 - 30	kg/da
Açık Tarla Sebzeleri	40 - 60	kg/da
Sera Sebzeleri	40 - 60	kg/da
Karpuz	30 - 50	kg/da
Havuç - Turp	30 - 40	kg/da
Zeytin (yaşına göre)	1 - 3 kg	kg/ağaç
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	1 - 3 kg	kg/ağaç
Elma (yaşına göre)	1 - 3 kg	kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1 - 3 kg	kg/ağaç
Üzüm (Bağ)	30 - 40	kg/da
Enginar	30 - 40	kg/da
Çilek	30 - 40	kg/da
Yer Fıstığı	30 - 40	kg/da
Muz	50 - 70	kg/da

“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.”

Gromfer

30.0.0+(5SO₃)

Organik Madde ile kaplanmış yüksek üre azotu içerikli özel bir Organomineral üst gübresidir. Yapısında organik madde %30'dur ve kompost Menşeilidir. Üre azotu yapısı itibariyle nem olmayan ortamda Amonyak olarak uçup kaybolma eğilimindedir. Kompost ve leonardit temelli Organik Madde sayesinde bu kayıp neredeyse sıfıra inmektedir. Toprağın organik madde miktarını artmasına katkı sağlar. Pamuk, Mısır, Domates ve Şeker Pancarı gibi ürünlerde üst gübre olarak kullanılması önerilir.



Garanti Edilen İçerik	%(W/W)
Toplam Organik Madde	20
Toplam Azot	30
Amonyum Azotu (NH ₄ ⁺ -N)	1
Üre Azotu (NH ₂ -N)	29
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	5
Maksimum Nem	5
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	5
Maksimum Klorür Miktarı (Cl ⁻)	2
EC	20 (dS/m)
pH	5-7

Kullanım Şekli: Ekim Öncesi Taban Gübresi Olarak Toprakdan Uygulanır.		
Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı		
Bitki Deseni	Kullanım Miktarı	Birimi
Patates	50 - 70	kg/da
Buğday - Arpa	30 - 40	kg/da
Pamuk	25 - 35	kg/da
Çeltik	30 - 50	kg/da
Mısır	30 - 50	kg/da
Şeker Pancarı	30 - 40	kg/da
Soğan	30 - 40	kg/da
Ayçiçeği	20 - 30	kg/da
Açık Tarla Sebzeleri	40 - 60	kg/da
Sera Sebzeleri	40 - 60	kg/da
Karpuz	30 - 50	kg/da
Havuç - Turp	30 - 40	kg/da
Zeytin (yaşına göre)	1 - 3 kg	kg/ağaç
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	1 - 3 kg	kg/ağaç
Elma (yaşına göre)	1 - 3 kg	kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1 - 3 kg	kg/ağaç
Üzüm (Bağ)	30 - 40	kg/da
Enginar	30 - 40	kg/da
Çilek	30 - 40	kg/da
Yer Fıstığı	30 - 40	kg/da
Muz	50 - 70	kg/da

“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.”

Gromfer

21.0.0+(24SO₃)

Organik Madde ile harmanlanmış amonyum azotu içerikli bir Organomineral taban ve üst gübresidir. Yapısında organik madde %20'dir. İçerisindeki yüksek kükürt sayesinde pH'yı dengeler ve diğer gübrelerinde alımını kolaylaştırır. Toprağın organik madde miktarını artmasına katkı sağlar. Tüm kültür bitkilerinde kullanılabilecek bir taban ve üst Organomineral gübresidir.



Garanti Edilen İçerik	%(W/W)
Toplam Organik Madde	20
Toplam Azot	21
Amonyum Azotu (NH ₄ ⁺ -N)	7
Üre Azotu (NH ₂ -N)	14
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	24
Maksimum Nem	5
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	5
Maksimum Klorür Miktarı (Cl ⁻)	0,5
EC	20 (dS/m)
pH	5-7

Kullanım Şekli: Ekim Öncesi Taban Gübresi Olarak Toprakdan Uygulanır.		
Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı		
Bitki Deseni	Kullanım Miktarı	Birimi
Patates	50 - 70	kg/da
Buğday - Arpa	30 - 40	kg/da
Pamuk	25 - 35	kg/da
Çeltik	30 - 50	kg/da
Mısır	30 - 50	kg/da
Şeker Pancarı	30 - 40	kg/da
Soğan	30 - 40	kg/da
Ayçiçeği	20 - 30	kg/da
Açık Tarla Sebzeleri	40 - 60	kg/da
Sera Sebzeleri	40 - 60	kg/da
Karpuz	30 - 50	kg/da
Havuç - Turp	30 - 40	kg/da
Zeytin (yaşına göre)	1 - 3 kg	kg/ağaç
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	1 - 3 kg	kg/ağaç
Elma (yaşına göre)	1 - 3 kg	kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1 - 3 kg	kg/ağaç
Üzüm (Bağ)	30 - 40	kg/da
Enginar	30 - 40	kg/da
Çilek	30 - 40	kg/da
Yer Fıstığı	30 - 40	kg/da
Muz	50 - 70	kg/da

“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.”

gr mfer

KATI ORGANİK G BRELER



Grombio

İçerisinde bulunan %70 organik madde sayesinde çorak ve organik maddece yetersiz toprakların ıslahında kullanılması önerilir. %20 Humik-Fulvik asit içermektedir. Toprağın tuzluluğunu giderir. Kaymak tutmayı önler. Fermente olduğu için içerisinde yabancı ot tohumu, nematod vb. gibi zararlı içerikler bulundurmaz.



Garanti Edilen İerik	%(W/W)
Toplam Organik Madde	70
Organik Karbon	32
Toplam Azot	2
(C/N)	15
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	25
Maksimum Nem	20
EC	20 (dS/m)
pH	5-7

Kullanım Şekli: Ekim Öncesi Taban Gübresi Olarak Toprakdan Uygulanır.		
Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı		
Bitki Deseni	Kullanım Miktarı	Birimi
Patates	50 - 70	kg/da
Buğday - Arpa	30 - 40	kg/da
Pamuk	25 - 35	kg/da
eltik	30 - 50	kg/da
Mısır	30 - 50	kg/da
Şeker Pancarı	30 - 40	kg/da
Soğan	30 - 40	kg/da
Ayieği	20 - 30	kg/da
Aık Tarla Sebzeleri	40 - 60	kg/da
Sera Sebzeleri	40 - 60	kg/da
Karpuz	30 - 50	kg/da
Havuç - Turp	30 - 40	kg/da
Zeytin (yaşına göre)	1 - 3 kg	kg/ağaç
Sert ve Yumuşak ekirdekli Meyve Ağaçları	1 - 3 kg	kg/ağaç
Elma (yaşına göre)	1 - 3 kg	kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1 - 3 kg	kg/ağaç
Üzüm (Bağ)	30 - 40	kg/da
Enginar	30 - 40	kg/da
ilek	30 - 40	kg/da
Yer Fıstığı	30 - 40	kg/da
Muz	50 - 70	kg/da

“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.”



gromfer

Energrom Balıkesir Biyogaz Enerji ve Gübre Üretim A.Ş.
Energrom Balıkesir Biogas Energy & Fertilizer Production Inc.
Halalca Mah. Ovaköy Yolu 4. km Altıeylül, Balıkesir / Türkiye
info@gromfer.com <http://www.gromfer.com>